



مقاله پژوهشی

ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (*Prangos Ferulace*) و بارهنگ (*Plantago Major L.*) علیه گونه‌های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برونتنی

یدالله عدالت‌پناه^۱، سوسن رستم‌پور^{۲*}، ایمان پولادی^۳، سجاد رجایی‌نژاد^۴

^۱ دکترای تخصصی بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلوی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

^۲ دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

^۳ کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

^۴ کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

چکیده

مقدمه: گیاهان دارویی بهدلیل داشتن ترکیبات متنوع ضدقارچی می‌توانند در درمان بیماری‌ها مؤثر باشند. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر و بارهنگ علیه گونه‌های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برونتنی صورت گرفته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده است. گیاهان جاشیر و بارهنگ در فصل بهار از فروشگاه‌های یاسوج تهیه شدند و شرکت دارویی زردبند یاسوج آن‌ها را از نظر علمی تأیید کرد و پس از ارسال به مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، عصاره استخراج شد. بهمنظور تهیه عصاره‌ی آبی گیاهان، به ۳۰ میلی‌لیتر آب مقطر، ۳ گرم پودر گیاه اضافه شد و به مدت ۲۴ ساعت روی شیکر (بهداد، تهران، ایران) قرار گرفت. سویه‌ی استفاده شده در مطالعه‌ی حاضر کاندیدا آلبیکانس ATCC 10231 است که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد. در مطالعه‌ی حاضر از غلظت‌های ۷/۵ و ۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره‌ی الکلی شده‌ی جاشیر و بارهنگ و برای اندازه‌گیری قطر هاله‌ی عدم رشد بر حسب میلی‌متر از روش انتشار دیسک کاغذی استاندارد استفاده شد. برای اندازه‌گیری حداقل غلظت مهاری از MIC50 و MIC90 استفاده شد. در پایان تعداد سلول‌های زنده شمارش و داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ و آزمون آنوا تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد در غلظت ۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر حداقل قطر عدم تشکیل هاله مشاهده شد که برای جاشیر ۱۵/۳ میلی‌متر و بارهنگ ۱۲/۴ میلی‌متر بوده است. درخصوص حداقل غلظت مهارکننده نتایج نشان داد MIC50 و MIC90 به ترتیب برای جاشیر ۱۹ و ۳۸ میکروگرم بر میلی‌لیتر و برای بارهنگ ۱۴ و ۲۹ میکروگرم بر میلی‌لیتر بدست آمد ($P < 0.05$). درخصوص شمارش زنده نتایج نشان داد در رقت ۱۰ کمترین تعداد سلول زنده تشکیل شد که برای جاشیر میانگین $7/3$ CFU/ml و برای بارهنگ $4/2$ CFU/ml بدست آمد.

نتیجه‌گیری: جاشیر و بارهنگ بهدلیل داشتن ترکیبات دارویی مؤثر، مانع فعالیت کاندیدا آلبیکانس می‌شوند.

کلمات کلیدی: کاندیدا آلبیکانس، بارهنگ، جاشیر، فلوکونازول

مقدمه

ثانویه‌ی گیاهی هستند که به‌طور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی به‌عنوان ترکیباتی با خاصیت ضدمیکروبی استفاده می‌شوند (۶).

بارهنج با نام علمی *Plantago Major* گیاهی متعلق به خانواده پلانتازیناسه است که در اروپا و آسیا به‌فراوانی یافت می‌شود. بارهنج گیاهی علفی با ارتفاع ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر است که برگ‌ها و دمبرگ‌های بلندی دارد. طول برگ‌ها ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر و تخمرگشکل و پهن است. گل‌ها در یک گل‌آذین استوانه‌ای قرار گرفته‌اند و کوچک و سفید مایل به زرد و نامشخص هستند (۷).

بررسی آلدگی به کاندیدا آلبیکانس و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر جیرفت نشان داد شیوع کاندیدیازیس بر اساس کشت مشبت کاندیدا آلبیکانس در ترشحات واژن زیاد است و در گروه‌هایی از زنان با عوامل خطر خاص بیشتر است. دانستن این عوامل خطر می‌تواند در تشخیص و درمان زنان مبتلا کمک کند (۸).

بررسی تأثیر اسانس آویشن بر کاندیدا آلبیکانس جداسده از بیماران مبتلابه کاندیدیازیس دهانی در شرایط آزمایشگاهی نشان داد اسانس آویشن اثر ضدقارچی بسیار خوبی علیه کاندیدا آلبیکانس دارد و در مقادیر نسبتاً کم می‌تواند از رشد کاندیدا آلبیکانس در محیط کشت جلوگیری کند (۹).

نتایج بررسی اثرات اسانس‌ها و عصاره‌های ۵۰ گیاه دارویی ایران روی یک سویه‌ی استاندارد کاندیدا آلبیکانس در شرایط آزمایشگاهی بیانگر خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی قابل توجهی ناشی از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای موجود در عصاره‌ی گیاه مذکور است. علاوه‌بر این، عصاره‌ی گیاه بارهنج اثر ضدکاندیدیازی بیشتری نسبت به باکتری نشان داده است (۱۰).

کاندیدیازیس نوعی بیماری قارچی عفونی ناشی از پاتوژن‌های فرصت‌طلب گونه‌های کاندیدا آلبیکانس است. به‌دلیل افزایش تعداد بیماران دچار نقص سیستم ایمنی و درمان طولانی با آنتی‌بیوتیک‌های مختلف، شیوع کاندیدیازیس رو به افزایش است (۱). به‌طور کلی کاندیدا آلبیکانس به‌عنوان چهارمین عامل عفونت‌های خونی بیماران بستری در بیمارستان مطرح شده‌اند که تقریباً ۴۰ درصد از موارد مرگ‌ومیر را شامل می‌شود (۲). قارچ کاندیدا آلبیکانس تعداد زیادی عامل بیماری‌زاibi دارد و علت تغییر مورفولوژی از حالت مخمر به ریسه است (۳).

قارچ کاندیدا آلبیکانس عفونت دوره‌ای کاندیدیازیس را ایجاد می‌کند. تعداد محدودی داروی ضدقارچ برای درمان بیماری‌های ناشی از گونه‌های کاندیدا وجود دارند و استفاده‌ی بیش از حد از این داروها به پیدایش سوش‌های مقاوم منجر می‌شود (۴).

کاندیدا آلبیکانس عوامل بیماری‌زاibi بسیاری دارد؛ از جمله چسبندگی به سلول‌های اندوتیال و اپی‌تیال انسان، توانایی ترشح آنزیم‌های هیدرولیزکننده که بیشتر پروتئینازها و فسفولیپازها هستند، تغییر فنوتیپی و همچنین فرار از فاگوسیتوزشدن توسط سلول‌های ایمنی میزبان. علاوه‌بر این، از عوامل مهم بیماری‌زاibi کاندیدا آلبیکانس، چندشکلی‌بودن با توانایی تغییر برگشتن‌پذیر شکل‌های مخمری، ریسه‌ی حقیقی، ریسه‌ی کاذب و تشکیل بیوفیلم هستند. شکل ریسه‌ای و بیوفیلم کاندیدا آلبیکانس قادر به نفوذ به درون بافت میزبان، فرار از سیستم ایمنی و ایجاد عفونت است (۵).

جنس Prangos به تیره‌ی چتریان متعلق است و ۱۵ گونه‌ی مختلف در ایران دارد. جاشیر گیاهی پایا و بلند است که عمدها به‌عنوان علوفه‌ای غنی در تزییه‌ی دامها استفاده می‌شود. از طرف دیگر، اسانس‌ها از متابولیت‌های

سویه قارچی

قارچ مخمری کاندیدا آلبیکانس سویه‌ی ATCC 10231 است که از دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد.

روش تهیه‌ی اسانس بارهنگ و جاشیر

اسانس به روش تقطیر با آب تهیه شد. بدین منظور ۱۰۰ گرم از سرشاخه‌های خشک و پاک شده‌ی گیاهان جاشیر و بارهنگ جمع‌آوری شده با استفاده از آسیاب برقی خرد و پودر شد. سپس داخل بالن ژوژه دستگاه اسانس‌گیری (کلونجر، مدل دارونامه: بریتانیا) ریخته و به آن ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر اضافه شد. سپس جریان آب سرد مبرد برقرار و بالن ژوژه درون هیتر برقی دستگاه جا داده و دستگاه روشن شد. اجازه داده شد مدت دو ساعت فرایند تقطیر انجام شود. بعد از دو ساعت، هیتر دستگاه خاموش و حجم اسانس جمع‌شده با کمک درجات روی بورت دستگاه، مشخص و یادداشت شد. برای ذخیره‌سازی اسانس، یک شیشه‌ی رنگی کوچک توزین و وزن با درپوش آن یادداشت شد و اسانس در شیشه‌ی رنگی جمع‌آوری و تا زمان استفاده داخل یخچال قرار داده شد (۱۲).

روش تهیه‌ی عصاره‌ها

الف. روش تهیه‌ی عصاره‌ی اتانولی و استونی از بارهنگ و جاشیر

عصاره‌گیری به روش خیساندن و با استفاده از حلال‌های اتانول و استون انجام گرفت. بدین منظور ۱۰۰ گرم از گیاه پس از آسیاب کردن درون ظروف عصاره‌گیری ریخته و ۴ برابر وزن گیاه، حلال استون (۱۰۰ درصد) و یا اتانول (۸۰ درصد) اضافه و ۳ تا ۴ روز روی شیکر در دمای آزمایشگاه نگهداری شد. سپس محلول به دست آمده با استفاده از کاغذ صافی واتمن ۴۲ صاف و برای تبخیر حلال، درون بن‌ماری ۶۰ تا ۶۵ درجه سانتی‌گراد قرار داده شد.

در حال حاضر از داروهای ضدقارچی نظری فلوکونازول برای درمان عفونت‌های قارچی از جمله کاندیدیازپس استفاده می‌شود. (۱۱). مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos ferulacea L) و بارهنگ (Plantago major L) علیه گونه‌های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون‌تنی انجام شد.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع تجربی بود که بهصورت مقطعی در سال ۱۳۹۷ در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج صورت گرفت. محیط‌های کشت استفاده شده در مطالعه‌ی حاضر شامل نمونه‌های بررسی شده ۵ نمونه‌ی بالینی کاندیدا آلبیکانس بود. گیاهان بارهنگ و جاشیر در فصل بهار از فروشگاه‌های یاسوج تهیه شد و شرکت دارویی زردبند یاسوج آن‌ها را از نظر علمی تأیید کرد.

مواد استفاده شده شامل محیط‌های کشت ائوزین متیلن بلو آگار (سیگما: آمریکا)، تریپتیکیس سوی براث (مرک: آلمان)، مولر هینتون آگار (سیگما: آمریکا)، ساپورو دکستروز آگار (سیگما: آمریکا)، حلال‌های اتانول (رازی، ایران) و استون (رازی، ایران)، کلرید باریوم (سیگما: آمریکا)، اسیدسولفوریک (مرک: آلمان)، آب مقطر و فلوکونازول (فوجی: ژاپن)، دی‌متیل سولفوکساید (سیگما: آمریکا) هستند. تجهیزات استفاده شده شامل پلیت (صنایع پزشکی ایران تولید)، لام نئوبار (پارس آزمون)، دستگاه لیوفلیزاتور (ورتمین: آلمان)، دستگاه اسانس‌گیری (کلونجر، مدل دارونامه: بریتانیا)، بالن (صنایع پزشکی ایران تولید)، هیتر برقی (امسان)، کاغذ صافی واتمن (صنایع پزشکی ایران تولید)، اتوکلاو (صنایع پزشکی ایران تولید)، الیز ریدر (هیستاران)، انکوباتور (پارس آزمون) هستند.

مقایسه‌ی کدورت آن با کدورت محلول استاندارد نیم مک فارلنده، سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلنده تهیه شد (جذب نوری سوسپانسیون در طول موج ۶۲۵ نانومتر صورت می‌گیرد) (۱۵).

در مرحله‌ی بعد، به کمک سوپ پنبه کشت سفرهای از سوسپانسیون قارچی روی محیط مولر هینتون آگار انجام شد. پس از گذشت ۱۵ دقیقه از کشت سفرهای، دیسک‌های ضدمیکروبی روی محیط کشت قرار داده شدند. ۱۵ دقیقه بعد از قراردادن دیسک‌ها، پلیت‌ها در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۸ تا ۲۴ ساعت انکوبه و پس از آن قطر هاله‌ی عدم رشد با خط‌کش اندازه‌گیری و نسبت به کنترل مقایسه شد (۱۶).

میزان حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimum Inhibitory Concentration) از طریق آزمایش رقت‌های دو برابری از عصاره‌های تهیه‌شده بارهنگ و جاشیر تعیین شد. به‌منظور بررسی نتایج در موارد لازم آزمایش‌ها به‌صورت سه‌تایی انجام و نتایج میانگین گزارش شد. برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد از روش ماکروتیتر استفاده شد (۱۵ و ۱۶).

برای بررسی تعداد کلنی‌ها ابتدا سلول‌های مخمری به تعداد 10^3 وسط لام نتوبار برای هر کدام از ایزووله‌ها شمارش شد. در ادامه و درون پلیت‌های ۹۶ خانه‌ای، ۲۰۰ میکرولیتر از هر کدام از سلول‌های مدنظر در ته پلیت ریخته و حدود ۱۰۰ میکرولیتر نیز از سلول‌های مخمری مدنظر اضافه شد. پس از گذشت ۲۴ ساعت از انکوباسیون ابتدا سوپ روبی برداشته و به مقدار ۱۱ لاندا از آن روی محیط سایورو دکستروز آگار کشت داده شد. از رقت‌های ۱۰، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌لیتر عصاره‌ی جاشیر، بارهنگ و فلوکونازول علیه کاندیدا آلبیکانس استفاده شد. تعداد مخمرها بر اساس واحد سازنده‌ی کلنی (CFU) با استفاده از روش شمارش

عمل تغليظ تا رسیدن به حدود ۵ درصد مقدار اولیه‌ی هر عصاره ادامه یافت (۱۲).

ب. روش تهیه‌ی عصاره‌ی آبی از بارهنگ و جاشیر

بدین منظور مقدار لازم از گیاه آسیاب شده (۱۰۰ گرم) داخل ظرف عصاره‌گیری ریخته و ۴ برابر آن آب مقطر اضافه شد. ظرف مدنظر روی حرارت ملایم قرار گرفت و دائمًا مخلوط شد تا اولین نشانه‌های جوشیدن دیده شود. پس از جوشاندن محلول به مدت ۱۵ دقیقه صاف شد (کاغذ صافی واتمن ۴۲) و با استفاده از دستگاه لیوفلیزاتور به مدت ۹۶ ساعت در دمای ۵۰-۵۰ mbar لیوفلیزه شد (۱۳).

دارو

در این مطالعه از فلوکونازول (شرکت فوجی ژاپن) حل شده در دی‌متیل سولفوكساید (شرکت سیگما) و آب مقطر استفاده شد که در مقادیر کم تا زمان مصرف در دمای ۷۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند (۱۴).

بررسی خاصیت ضدقارچی جاشیر، بارهنگ و فلوکونازول

الگوی حساسیت ضدقارچی جدایه‌های قارچ کاندیدا آلبیکانس با آزمایش آنتی‌بیوگرام (انتشار دیسک) تعیین شد. بدین منظور، ابتدا با اضافه کردن ۰/۵ میلی‌متر محلول کلرید باریوم $1/5$ درصد به $99/5$ میلی‌لیتر اسید‌سولفوریک یک درصد، محلول نیم مک فارلنده تهیه شد. برای تهیه‌ی سوسپانسیون قارچی مقداری از کلونی‌های موجود در محیط ائوزین متیلن بلو آگار (EMB) در لوله‌های حاوی محیط تریپتیکیس سوی براث (TSB) تلقیح شد و لوله‌ها به مدت ۱۵ دقیقه در انکوباتور قرار گرفت تا به کدورت مدنظر برسد. سپس با

بازدارندگی مشاهده شده است. همچنین بارهنگ نسبت به فلوکونازول اثر مهاری بیشتری داشته است ($P < 0.05$) (جدول ۱ و ۲).

نتایج اندازه‌گیری حداقل غلظت مهاری نشان می‌دهد جاشر نسبت به بارهنگ در MIC50 و MIC90 خاصیت ضدکاندیدایی بیشتری از خود نشان می‌دهد که برای MIC90 این بازدارندگی بیشتر است. جاشر و بارهنگ نسبت به فلوکونازول اثر مهاری بیشتری بر رشد کاندیدا/آلبیکانس دارند ($P < 0.05$) (جدول ۳ و ۴).

نتایج شمارش زنده نشان داد کاهش رقت از رشد

زنده (Viable Count) در فواصل زمانی ۲ تا ۴۸ ساعت پس از شروع گرمخانه‌گذاری محاسبه شد (۱۷).

برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و آزمون واریانس یک‌طرفه (ANOVA) استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان داد عصاره‌ی جاشر نسبت به بارهنگ و فلوکونازول بر مهار رشد کاندیدا/آلبیکانس اثرگذارتر بوده که در غلظت ۱۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بیشترین تأثیر

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار عدم تشکیل قطره‌ای کاندیدا/آلبیکانس در غلظت‌های مختلف

عصاره‌ی استفاده شده	۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر	۱۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر	۷/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر	سطح معنی‌داری
جاشر	$15/3 \pm 2/1$	$11/8 \pm 2/2$	$9/5 \pm 2/1$	$0/011$
بارهنگ	$12/4 \pm 1/6$	$8/2 \pm 1/3$	$6/3 \pm 2/1$	
فلوکونازول	$5/8 \pm 1/4$	$5/3 \pm 2/1$	$4/9 \pm 1/4$	

جدول ۲: نتایج آزمون توکی درخصوص عدم تشکیل قطره‌ای

گروه (الف)	گروه (ب)	سطح معنی‌داری
جاشر	بارهنگ	$*0/001$
باوهنگ	فلوکونازول	$*0/001$
باوهنگ	فلوکونازول	$*0/001$

در سطح کمتر از 0.01 معنی دار می‌باشد.


جدول ۳: نتایج اندازه‌گیری حداقل غلظت مهاری عصاره‌های گیاهی بارهنگ، جاشر و فلوکونازول بر رشد کاندیدا/آلبیکانس

عصاره‌ی استفاده شده	محدوده‌ی آزموده شده	حداقل غلظت مهاری	MIC90	MIC50	Sطح معنی‌داری
جاشر	$0/03-295$	۱۹	۳۸	$*0/001$	$*0/001$
باوهنگ	$0/05-260$	۱۴	۲۹	$*0/001$	$*0/001$
فلوکونازول	$0/06-256$	۰/۲	۰/۴		

* در سطح $P < 0.05$ معنی دار است.

جدول ۴: نتایج آزمون توکی درخصوص حداقل غلظت مهاری

گروه (الف)	گروه (ب)	سطح معنی‌داری
جاشر	بارهنگ	$*0/001$
باوهنگ	فلوکونازول	$*0/001$
باوهنگ	فلوکونازول	$*0/001$



شکل ۱: نتایج شمارش زنده عصاره‌های گیاهی بارهنگ، جاشیر و فلوکونازول بر رشد کاندیدا آلبیکانس

کردنده (۱۸). نتایج این مطالعه با مطالعه Valeh-Silva و همکاران (۲۰۱۲) همسو است. آنان خاصیت ضد میکروبی انسانس *Origanum Vulgare* را علیه پاتوژن‌هایی هم چون کاندیدا آلسکنسر، پرسی، کر دند (۱۹).

نتایج MIC نشان داد جاشیر در MIC90 بیشترین خاصیت ضدکاندیدایی را داشته و فلوکونازول در حداقل غلظت مهاری MIC50 کمترین خاصیت ضدکاندیدایی را داشته است. برای بررسی تفاوت بین انسان‌های گیاهی بارهنج، جاشیر و فلوکونازول نتایج آزمون واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی نشان داد این تفاوت معنادار است و این معناداری به‌کمک آزمون توکی بررسی شد که نتایج نشان داد جاشیر نسبت به بارهنج و فلوکونازول و بارهنج نسبت به فلوکونازول خاصیت ضدکاندیدایی قوی‌تری داشته‌اند. نتایج این مطالعه با یافته‌های امینیان و همکاران (۱۳۹۷) همسو است. آنان اثر ضرباکتریایی عصاره‌ی هیدروالکلی بارهنج کبیر و ناخنک را بر تعدادی باکتری گرم منفه و گرم مثبت برسی کردند (۲۰).

نتایج شمارش زنده کاندیدا /بیکننس نشان داد در رقت ۱۰ کمترین تعداد کلنی و در رقت ۱۰۰۰ بیشترین تعداد کلنی، تشکلا، شد. د. خصوص انسان ها، گیاه، یا، هنگ،

کاندیدا آلبیکانس جلوگیری می‌کند، به طوری که از میان رقت‌های استفاده شده در مطالعه‌ی حاضر، رقت ۱۰ میلی‌لیتر و غلظت ۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بیشترین تأثیر را بر مهار رشد کاندیدا آلبیکانس داشته است. در رقت ۱۰ میلی‌لیتر و غلظت ۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر تعداد کلی‌های مشاهده شده برای جاشیر، بارهنگ و فلوکونازول به ترتیب $\frac{۱۵}{۶}$ CFU/ml، $\frac{۷}{۳}$ CFU/ml و $\frac{۴}{۲}$ CFU/ml بوده است (شکل ۱).

بحث

نتایج دیسک‌گذاری نشان داد جاشیر خاصیت ضدقارچی‌تری نسبت به بارهنج داشته است. جاشیر و بارهنج در مقایسه با فلوکونازول خاصیت ضدقارچی قوی‌تری داشته‌اند. غلظت ۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره‌ی گیاهی جاشیر و بارهنج نسبت به غلظت‌های ۱۵ و ۷/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر خاصیت ضدکاندیدایی قوی‌تر، داشته‌اند.

نتایج این مطالعه با یافته‌های موقری‌پور و همکاران (۱۳۹۷) همسو است. آنان اثر ضدقارچی عصاره‌ی گیاه بونه، کده، با نیستاتن، ۱-۲ کاندیدا آلیکتین، دیس-

فعالیت می کند آلفاپین، بتاپین، سزکوئیترین و مونوتربن است که با مهار کردن فعالیت قارچی مانع فعالیت آنها می شود. بارهنج یکی دیگر از گیاهان دارویی است که می تواند در ازین بردن قارچ های بیماری زا مؤثر باشد. این گیاه در این مطالعه همچون مطالعات پیشین، در ازین بردن فعالیت قارچی نسبت به جاشیر مؤثرتر بوده است.

حمایت مالی

این طرح با حمایت مالی دانشگاه پیام نور دهدشت صورت گرفته است.

تضاد منافع

نویسنده‌گان اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر از یک طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه پیام نور (به عنوان حامی مالی) گرفته شده و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (برای انجام آزمایش‌ها) انجام شده است. بدین وسیله از تمام افرادی که در انجام این طرح با پژوهشگران همکاری کردند، تشکر و قدردانی می‌شود.

جاشیر و فلوکونازول نتایج نشان داد جاشیر کمترین تعداد کلني زنده کاندیدا /بیکنس و فلوکونازول بیشترین تعداد کلني زنده کاندیدا /بیکنس را داشته است. در خصوص غلظت‌های استفاده شده از انسان‌های گیاهی و فلوکونازول نتایج نشان داد غلظت ۳۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر کمترین تعداد کلني زنده کاندیدا /بیکنس را تشکیل داده و بیشترین تعداد کلني زنده کاندیدا /بیکنس مربوط به غلظت ۷/۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بوده است. نتایج این مطالعه با یافته‌های اکبری و همکاران (۱۳۸۵) همسو است. آنان اثرات ضدقارچی عصاره‌های گیاهی آویشن و مرزنجوش را علیه ایزوله‌های بالینی کاندیدا /بیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول بررسی کردند (۲۱). نتایج این مطالعه با یافته‌های کفash فرخ و همکاران (۱۳۹۲) همسو است. آنان ترکیبات ثانویه و اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی جاشیر را به صورت مروری بررسی کردند (۲۲).

نتیجه‌گیری

در تحلیل یافته‌های حاصل از این مطالعه می‌توان گفت که گیاهان دارویی به دلیل داشتن مواد آنتی‌اکسیدان و شیمیابی مانع از فعالیت عوامل میکروبی و قارچ‌های بیماری زا می‌شوند. جاشیر از نظر داشتن ترکیبات دارویی گیاه مستعدی است که می‌تواند در مبارزه با عوامل قارچی مؤثر باشد. مهم‌ترین موادی که در جاشیر علیه میکروب‌ها

References

- Edalat Panah Yadolah, Enayati Parvar Fariba, Rajae Nejad Sajjad. Investigating the effect of local rangeland honey on Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces on the activity of *Candida albicans*. J Navid No. 2020; 22(72):44-54.
- Vandenbosch D, Braeckmans K, Nelis HJ, Coenye T. Fungicidal activity of miconazole against *Candida* spp. Biofilms. J Antimicrob Chemother. 2009; 65(4):694-700.
- Al-Waili NS. Mixture of honey, beeswax and olive oil inhibits growth of *Staphylococcus aureus* and *Candida albicans*. Arch Med Res. 2005; 36(1):10-3.
- Khodavandi A, Tahzir NA, Cheng PW, Chen PY, Alizadeh F, Hrmal NS, et al. Antifungal activity of Rhizome coptidis and Alpinia galangal against *Candida* species. J Pure Appl Microbiol. 2013; 7:1725-30.
- Kruppa M. Quorum sensing and *Candida albicans*. Mycoses. 2009; 52(1):1-10.
- Amiri H. Chemical composition and antibacterial activity of essential oil of *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. J Med Plants. 2007; 1(21):36-41.

7. Guo Y, He Y, Guo N, Gao J, Ni Y. Variations of the composition of the leaf cuticular wax among Chinese populations of *Plantago major*. *Chem Biodivers*. 2015; 12(4):627-36.
8. Khanjani N, Zamanian M, Molazadeh P, Sadeghi M. The prevalence of *Candida albicans* infection and related factors in women referring to health centers of Jiroft in 2010: a short report. *J Rafsanjan Univ Med Sci*. 2014; 13(6):569-76.
9. Zia M, Bayat M, Khalkhali H. In vitro antifungal effect of *Thymus vulgaris* essence on *Candida albicans* isolated from patients with oral candidiasis. *J Shahrekord Univ Med Sci*. 2011; 13(3):44-52.
10. Naeini A, Khosravi AR, Chitsaz M, Shokri H, Kamlnejad M. Anti-*Candida albicans* activity of some Iranian plants used in traditional medicine. *J Mycol Med*. 2009; 19(3):168-72.
11. Banaean-Boroujeni S, Rasti-Boroujeni M, Moghim H, Validi M, Mobini G, Kazemian A. In vitro effect of honey on *Candida albicans* and lactobacillus. *J Shahrekord Univ Med Sci*. 2010; 11(4):52-8. [in Persian].
12. Sayyah M, Moaied S, Kamalinejad M. Anticonvulsant activity of *Heracleum persicum* seed. *J Ethnopharmacol*. 2005; 98(1-2):209-11.
13. Allen KL, Molan PC, Reid GM. A survey of the antibacterial activity of some New Zealand honey. *J Pharm Pharmacol*. 1991; 43(12):817-22.
14. Shareyat SH. Qualitative and quantitative evaluation of the active constituents and control methods for medicinal plants. 1st ed. Isfahan: Mani Pub; 1998. P. 10-27.
15. Omran M, Maliji GH, Sefidgar A, Yosefi MR, Haji Ahmadi M, Moosavi S, et al. effect of honey from north of Iran on *Candida albicans*. *J Babol Univ Med Sci*. 2008; 10(5):15-22.
16. Nazemi Salman B, Yazdinejad A, Salah S, Sajedinejad N. Antifungal activity of essential oils of *Prangos frulacea*, *Ziziphora tenuior*, *Ferula gummosa* and *Dracocephalum moldavica* against *Candida albicans*. *J Qazvin Univ Med Sci*. 2017; 21(1):4-11.
17. Mayer FL, Wilson D, Hube B. *Candida albicans* pathogenicity mechanisms. *Virulence*. 2013; 4(6): 119-28.
18. Melo AS, Bizerra FC, Freymuller E, Arthington-Skagges BA, Colombo AL. Biofilm production and evaluation of antifungal susceptibility amongst clinical *Candida* spp. isolates, including strains of the *Candida parapsilosis* complex. *Med Mycol*. 2011; 49(3):253-62.
19. Movaghari Pour A, Sheikh Fathollahi M, Poor Zamani M, Abedini S, Jamali Z. Comparison of anti-fungal effect of *origanum vulgare* extract versus nystatin on *Candida albicans*; an in vitro study. *J Mashhad Dent Sch*. 2018; 42(3):277-1.
20. Vale-Silva L, Silva MJ, Oliveira D, Goncalves M, Cavaleiro C, Salgueiro L, et al. Correlation of the chemical composition of essential oils from *Origanum vulgare* subspecies. virens with their in vitro activity against pathogenic yeasts and filamentous fungi. *J Med Microbiol*. 2012; 61(2):252-60.
21. Aminian R, Mardani M, Davoodnia B. The effect of hydro alcoholic extract of *Plantago major* and *Astragalus hamosus* on some gram-positive and gram-negative bacteria. *J Plant Res*. 2018; 31(3): 956-67.
22. Akbari S. Antifungal activity of *thymus vulgaris* L. and *Origanum vulgare* L. against fluconazol-resistant and susceptible *Candida albicans* isolates. *J Med Plants*. 2007; 6(Suppl 3):53-62.
23. Kafash-Farkhad N, Asadi-Samani M, Khaledifar B. A review on secondary metabolites and pharmacological effects of *Prangos ferulacea* (L.) Lindl. *J Shahrekord Univ Med Sci*. 2013; 15(3):98-108.



Original Article

Evaluation of Antifungal Effects of *Prangos ferulace* and *Plantago major L* Plants Against Fluconazole-resistant *Candida albicans* Species in Extracorporeal Conditions

Yadolah Edalatpanah¹, Susan Rostampur^{2*}, Iman Puladi³, Sajjad Rajaeenejad⁴

¹ PhD in Biochemistry, Cellular and Molecular Research Center of Yasuj University of Medical Sciences, Iran

² PhD Student of Medical Biotechnology, Student Research Committee, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

³ Msc in Microbiology, Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Shahed University, Tehran, Iran

⁴ Msc in Agriculture, Yasuj University, Yasuj, Iran

Received: 10 March 2020

Accepted: 16 April 2020

Abstract

Introduction: Medicinal plants can be effective in treating diseases due to having various antifungal compounds. The aim of this study was to evaluate the antifungal effects of *Prangos ferulace* and *Plantago major L* against fluconazole-resistant *Candida albicans* in extracorporeal conditions.

Materials and Methods: This study was experimental. *Prangos ferulace* and *Plantago major L* plants were prepared from stores in Yasuj, Iran, in the spring and then scientifically approved by the Zardband Pharmaceutical Company in Yasuj. The extract was extracted after sending the plants to the Research Center for Medicinal Plants of Yasuj University of Medical Sciences. In order to prepare the aqueous extract of the plants, 3 g of plant powder was added to 30 ml of distilled water and placed on a shaker (Behdad, Tehran, Iran) for 24 h. The strain used in the present study was *Candida albicans* ATCC 10231, which was prepared by Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. In the present study, the alcoholic extracts of *Prangos ferulace* and *Plantago major L* were used at the concentrations of 7.5, 15, and 30 mg/ml. The non-growth halo diameter (in millimeters) was measured using the standard paper disc diffusion method. The minimum inhibitory concentrations (MICs) required to inhibit the growth of 90% and 50% of organisms were also evaluated. Finally, the number of living cells was counted, and the data were analyzed using ANOVA test in SPSS software (version 23).

Results: The results showed that at a concentration of 30 mg/ml, the maximum diameters of the non-growth halo were 15.3 mm for *Prangos ferulace* and 12.4 mm for *Plantago major L*. Regarding the MIC value, the MIC₅₀ and MIC₉₀ were respectively obtained as 19 and 38 µg/ml for *Prangos ferulace* and 14 and 29 µg/ml for *Plantago major L* ($P<0.05$). Considering the live cell count, the lowest number of live cells was formed at a dilution of 10. The mean value of this variable was obtained as 7.3 and 4.2 CFU/ml for *Prangos ferulace* and *Plantago major*, respectively.

Conclusion: *Prangos ferulace* and *Plantago major L* prevented the activity of *Candida albicans* due to their effective medicinal compounds.

Keywords: *Candida albicans*, Fluconazole, *Plantago major L*, *Prangos ferulace*

* Corresponding Author: Susan Rostampur, Student Research Committee, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Tel: 09190530899; Email: susanrostampur@yahoo.com